

Enkät för perioperativ smärtlindring vid kolorektal kirurgi

Öppen kolonkirurgi

12

Svar

18:20

Genomsnittlig tid för att slutföra

Aktivt

Status

1. Sjukhus

12

Svar

Senaste svar

"Ersta Sjukhus"

"Västerås"

"Södertälje"


2. Ger ni analgetika som premedicinering (ex.vis Alvedon, Gabapentin, Targiniq)?

● Ja

9

● Nej

3



3. Om Ja, vad?

9

Svar

Senaste svar


"Alvedon, Gabapentin"

"Alvedon"

"Alvedon, Oxycontin"


4. Använder ni spinalbedövning?

● Ja	1
● Nej	11



5. Använder ni EDA?

● Ja	12
● Nej	0




6. Om Ja, under hur många dagar?

12
Svar

Senaste svar
"2-4 dagar"
"2"
"2-4 dagar"


7. Använder ni korttidsverkande opioid peroperativt (ex.vis Remifentaniol, Rapifen)?

● Ja	8
● Nej	4




8. Använder ni långtidsverkande opioid peroperativt (ex.vis Fentanyl)?

● Ja	9
● Nej	3




9. Om Ja på fråga 8

- Som underhåll hela operationen 2
- Enbart inför avslut av operatio... 5




10. Har ni opioidfri anestesi?

- Ja 3
- Nej 8




11. Ger ni paracetamol intravenöst?

- Ja 8
- Nej 4



12. Använder ni Oxynorm (eller annan kortverkande opioid) inför avslut av operationen?

- Ja 4
- Nej 8




13. Om Ja, hur långt före operationslut?

4
Svar

Senaste svar

14. Använder ni Catapresan?

● Ja	6
● Nej	6




15. Om Ja, hur långt före operationsslut?

6
Svar

Senaste svar
"Vid start, ges ej generellt"

16. Använder ni NSAID intravenöst (ex.vis Dynastat, Toradol)?

● Ja	0
● Nej	12




17. Om Ja, vilket preparat och hur långt före operationsslut?

0
Svar

Senaste svar

18. Ger ni lokalanestetika i operationssåret?

● Ja	4
● Nej	8



19. Sort, styrka och antal ml?

3


Svar

Senaste svar
"Marcain 2,5mg/ml 20-40ml"

""

20. Använder ni TAPP (bukväggsblockad)?

● Ja	0
● Nej	12



21. Om Ja, vem lägger blockaden (kirurg, anestesilog)?

0

Svar

Senaste svar

""

22. Använder ni annan typ av blockad? Vilken?


1

Svar

Senaste svar


23. Ger ni Paracetamol postoperativt?

● Ja	12
● Nej	0




24. Använder ni långtidsverkande morfin (ex.vis Targiniq, Oxycontin)?

● Ja	6
● Nej	6




25. Använder ni korttidsverkande morfin vid behov (ex.vis Oxynorm)?

● Ja	9
● Nej	3



26. Använder ni NSAID?

● Ja	4
● Nej	8




27. Om Ja, vilket NSAID preparat?

4
Svar

Senaste svar
"Vid behov, celebra och vid rätt patient"


28. Använder ni Gabapentin?

● Ja	1
● Nej	11




29. Använder ni intravenöst Lidocain?

● Ja	0
● Nej	12



30. Använder ni annan analgetika?

● Ja	3
● Nej	9



31. Om Ja, vad?

3
Svar

Senaste svar
"Catapressan Ketanest"
"Vid avveckling av EDA ges Targiniq, Oxynorm"

32. Vilka preparat får patienten recept på vid utskrivningen?

12
Svar

Senaste svar
"Alvedon, Gabapentin, Targiniq ibland"
"Targiniq, oxynorm, alvedon"
"Alvedon, Targiniq, Oxynorm"

33. Får patienten skriftlig information om förväntad smärta?

● Ja	9
● Nej	3

